

第2類医薬品

睡眠改善薬

アンミナイト®

ドリンクタイプ 30mL×3本入

一時的な不眠によるこのよ様な症状の緩和

ヒツジの数が...

寝つきが悪い  
眠りが浅い

第2類医薬品

ゼリア新薬

あける

切り口にご注意ください

第2類医薬品

30mL

寝つきが悪い  
眠りが浅い

睡眠改善薬  
アンミナイト®

製造販売元  
ゼリア新薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町10-11  
お客様相談室 ☎03-3661-2080  
アンミナイトはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。  
副作用被害救済制度 ☎0120-149-9311  
販売名:アンミナイト

紙

睡眠改善薬

アンミナイト®

ドリンクタイプ 30mL×3本入

ヒツジの数が...  
寝つきが悪い  
眠りが浅い  
一時的な不眠による  
このよ様な  
症状の緩和



あける

切り口にご注意ください

第2類医薬品

30mL

寝つきが悪い  
眠りが浅い

睡眠改善薬  
アンミナイト®

製造販売元  
ゼリア新薬工業株式会社  
東京都中央区日本橋小舟町10-11  
お客様相談室 ☎03-3661-2080  
アンミナイトはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。  
副作用被害救済制度 ☎0120-149-9311  
販売名:アンミナイト

販売名:アンミナイト

この外箱は、お薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

ここを押してあける

第2類医薬品

30mL×3

【使用上の注意】

- ① 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- ② 口のかわき、下痢
- ③ 4.2-3の服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- ④ 翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じることもある。
- ⑤ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。(眠気をもよおして事故を起こすことがある。また、本剤の服用により、翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じる場合は、これらの症状が消えるまで、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。)
- ⑥ 授乳中は本剤を服用しないこと。
- ⑦ 服用前後は飲酒しないこと
- ⑧ 寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、連用しないこと。

【その他の注意】

【効能・効果】一時的な不眠の次の症状の緩和：寝つきが悪い、眠りが浅い

【用法・用量】寝つきが悪い時や眠りが浅い時、次の量を1日1回就寝前に服用する。

年齢 1日用量  
成人(15才以上) 1瓶(30mL)  
15才未満 服用しないこと。

【用法・用量に関連する注意】  
(1)用法、用量を厳守すること。  
(2)1回1瓶(30mL)を超えて服用すると、神経が高ぶるなど不眠な症状があらわれ、翌に眠れなくなることもある。  
(3)就寝前以外は服用しないこと。

【成分】1日量(1瓶30mL)中  
ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg、添加物:エリスリトール、スクロース、カラメル、安息香酸Na、クエン酸Na、香料、エタノール、パニリン、D-ソルビトール、pH調整剤2成分、その他成分

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

⑨ 副作用：事故が起こりやすくなる)

⑩ 過量服用しないこと

⑪ 次の人は服用しないこと (1)妊婦又は妊娠していると思われる人。(2)15才未満の小児。(3)日常的に不眠の人。(4)不眠症の診断を受けた人。

⑫ 3本を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー薬等)

⑬ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

⑭ 授乳中は本剤を服用しないこと

⑮ 服用前後は飲酒しないこと

⑯ 寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、連用しないこと。

⑰ 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

⑱ 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者(高齢者では眠気が強くあらわれたりまた反応に神経が高ぶるなどの症状があらわれることがある。)(3)薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。非閉塞性(5)次の診断を受けた人。緑内障、前立腺肥大

精神神経系 めまい、頭痛、起床時の頭重感、昼間の眠気、気分不快、神経痛、一時的な意識障害(注意力の低下、ねばり様症状、判断力の低下、言動の異常等)

循環器 動悸  
泌尿器 排尿困難  
その他 倦怠感



4 987103 045090

要確認

アンミナイトはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-9311 品名コード 5938

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎03-3661-2080

受付 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

製造番号  
使用期限  
[年.月]

紙